


Les fractures trochantériennes du sujet âgé PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

11 mai 2009 . Cours - Traumatologie - La fracture du col du fémur. . trochanter indolore); la fracture sous capital; la fracture cervico-trochantérienne . Elles sont fréquentes chez la personne âgée (surtout la femme . A lire aussi sur le sujet.
Dans la forme typique il s'agit d'une fracture du sujet âgé, de sexe féminin (2/1) . Le massif

trochantérien comprend le grand trochanter, sur lequel s'insère le.

Contexte : Les fractures trochantériennes représentent 65% des fractures de . fémorales--

Fractures--Tomographie; Fractures de la hanche--Sujet âgé; Adulte.

Le clou de Ender dans le traitement des fractures trochantériennes du sujet âgé. Résultats à propos d'une série de 60 cas M. Sène, C.D. Niang, M. Faye, J.C....

Les fractures trochantériennes du sujet âgé, Gérard Saillant, F. Laude, F. Mabesoone, ERREUR PERIMES Sauramps. Des milliers de livres avec la livraison.

1 Prothèses de hanche dans les fractures instables du massif trochantérien du sujet âgé. à propos de 101 cas. D. Saragaglia D. Petek N. Mercier B.

Traumatismes fréquents Patient âgé après une chute Fracture du col fémoral Cause la plus fréquente d'admission en urgence du sujet âgé en orthopédie. Antécédent de . Environ 50 % des fractures de hanche sont trochantériennes [3].

. auquel il est relié (on parle dans ce cas de fracture trochantérienne). . Les symptômes de la fracture du col du fémur varient en fonction de l'âge et du sujet.

le col fémoral, rétréci sagittalement entre tête et massif trochantérien avec sa face . Fractures du sujet âgé : Traumatisme minime, parfois en 2 temps (très.

Les fractures de l'extrémité supérieure du fémur du sujet âgé demeurent d'un pronostic redoutable. . l'ostéosynthèse des fractures per-trochantériennes, par.

Fracture du sujet âgé (signe de fin de vie). • Fracture ostéoporotique. • Prédominance féminine. • 2/3 sont trochantériennes et 1/3 sont cervicales vraies.

. rapide de l'état général d'une personne âgée suite à une affection médicale aiguë, pouvant conduire au décès). . Les complications spécifiques liées à la fracture et à la chirurgie entreprise : . Pour les fractures per-trochantériennes : .

Les Fractures du sujet âgé constituent un problème majeur de santé publique . Les fractures du massif trochantérien sont nettement les plus fréquentes de la.

Ces fractures surviennent le plus souvent chez des patients âgés sujets à . les fractures du col du fémur des fractures touchant le massif trochantérien:.

28 nov. 2013 . 29. Les fractures proximales du fémur sont des fractures fréquentes et graves du sujet âgé : 1. Fréquentes de part le terrain particulièrement.

Ostéosynthèse des fractures de la région trochantérienne par clou gamma — A .. par vis dynamique D.H.S. dans les fractures trochantériennes du sujet âgé.

FRACTURE DU COL ET DE LA TETE DU FEMUR . Les fractures de l'extrémité supérieure du fémur sont des fractures du sujet âgé (74 ans en moyenne) sexe F 2/1, en majorité traumatique par chute de sa . Cervico-trochanterienne ; 2.

Autre traitement possible des fractures du col chez les sujets âgés : les prothèses fémorales. Thompson. Moore . Fractures per-trochantériennes complexes.

âgées et le pronostic fonctionnel chez le sujet jeune. Le but de ce . En ce qui concerne les fractures trochantériennes la tranche d'âge varie entre 75 et 89.

vital du sujet âgé fragile, et à tout âge le pro- nóstico fonctionnel. On distingue deux types lésionnels (fractures cervicales et fractures trochantériennes), qui.

Fractures cervicales : ▫ autres dénominations : transcervicales, cervicales . ITEM 119

MÉCANISME ▫ Chute de sa hauteur : ▫ terrain : sujet âgé; ITEMS 107 ET.

Urgence traumatique la plus fréquente du sujet âgé après les fractures de l'extrémité inférieure . les fractures trochantériennes; les fractures cervicales vraies.

Fractures trochantériennes et sous trochantériennes. Paris : Société française de . No 56 : Ostéoporose. No 64 : Autonomie et dépendance chez le sujet âgé.

Résumé. Le but de cette étude est d'évaluer les résultats du traitement des fractures trochantériennes par clou de Ender chez le sujet âgé. Il s'agit d'une étude.

23 janv. 2011 . Dans la forme typique il s'agit d'une fracture du sujet âgé, de sexe féminin . •Le massif trochantérien comprend le grand trochanter, sur lequel.

5 déc. 2012 . Chez le sujet âgé : Décompensation de tares et complications de décubitus .
Fracture trochanterienne = 60 % des fractures de l'extrémité.

La fracture du col du fémur et de l'extrémité supérieure du fémur . Lors d'une fracture per trochantérienne haute, deux alternatives se présentent, la prothèse de.

Qu'est-ce qu'une fracture du col du fémur ? Les fractures du col du fémur et du massif trochantérien sont fréquentes chez le sujet âgé atteint d'ostéoporose.

Les fractures du fémur proximal surviennent dans la très grande . sujets âgés ostéoporotiques présentant souvent des tares . Les fractures trochantériennes.

Elles touchent essentiellement le sujet âgé ostéoporotique (80 ans en moyenne et 75% . fractures du massif trochantérien (60%) ou fractures extra-capsulaires.

30 oct. 2010 . Les fractures de la région trochantérienne sont un peu plus . chez le sujet âgé, engageant le pronosticpréférentiellement chez le sujet âgé,.

Analyse des fractures trochantériennes des patients âgés de plus de 75ans, . Introduction Les fractures du massif trochantérien du sujet âgé Grégory Kern ont.

Noté 0.0/5: Achetez Les fractures trochantériennes du sujet âgé de Gérard Saillant: ISBN: 9782840231073 sur amazon.fr, des millions de livres livrés chez vous.

. les fracturent de l'extrémité du fémur (fractures per-trochantériennes et fractures . Evolution de l'incidence des fractures: pour une même classe d'âge il existe . des sujets âgés, avec un os fragile (ostéoporose), ce qui permet souvent une.

à la population du même âge est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. .. tion du col sur le fût fémoral, dites fractures trochantériennes. Le terme.

En général, les fracture de la hanche surviennent chez des personnes de plus de 65 ans, le risque croît très rapidement après l'âge de 80 ans.

Pathologie fréquente du sujet âgé, la fracture pertrochantérienne intéresse la .. soutenir le massif trochantérien c'est-à-dire 2.5 cm au dessous du bord inférieur.

18 mai 2017 . du sujet âgé. Fractures de . fractures dans les prochaines décennies en raison du vieillissement de la .. Hanche Fractures trochantériennes.

Elles sont classées en fracture parcellaire et en fractures trochantériennes plus ou . chez les sujets âgés, en cas de grand déplacement d'une fracture du col et.

Quelle classification permet de décrire une fracture trochanterienne? Sur quoi . Quel est le traitement d'une fracture trochanterienne? . Chez le sujet âgé?

. en faisant un problème de santé publique. • Mortalité chez le sujet âgé! . Cas de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur . Fracture trochantériennes.

Elles représentent un vrai risque d'handicap et de mortalité chez le sujet âgé bien portant . Les fractures per trochantériennes touchent le reste de l'extrémité.

Dans la forme typique, il s'agit d'une fracture du sujet âgé de sexe . trochantérien, elle intéresse le col fémoral réalisant des fractures cervicales vraies qui.

Mots clés : Ostéoarticulaire, Bassin, Hanche, Ostéoporose, Sujet âgé ... Les fractures du massif trochantérien sont classées par l'AO (Association pour.

Les fractures trochantériennes du sujet âgé. Editeur : Sauramps médical Année : 1996 ISBN : 2-84023-107-7 Collation : 288 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm Prix.

. les fractures per-trochantériennes instables : à propos d'une série continue de 180 cas opérés chez le sujet âgé. [Bernard Debeaumont; Université de Rouen,]

3 sept. 2014 . La fracture trochantérienne est une urgence différée qui se voit essentiellement chez le sujet âgé, dont les processus physiologique sont en.

7 mai 2012 . MOTS-CLES : Fractures - Trochantériennes - Ostéosynthèse ... Elles surviennent

généralement chez le sujet âgé, de plus en plus exposé par.

Chez les sujets âgés, la fracture du col du fémur menace la vie non pas tant du fait du . Chez le sujet jeune, au contraire, les fractures cervico-trochantériennes.

L'hématome dans la région trochantérienne n'est pas extrêmement utile au diagnostic ... Les fractures pertrochantériennes du sujet âgé, étude prospective non.

7 déc. 2016 . Chirurgie et fractures intra-capsulaires de type Garden 1 et 2 . . La prise en charge des fractures de l'extrémité proximale du fémur du sujet âgé est une ur- .

trochantériennes par arthroplastie de hanche présenterait des.

le massif trochantérien. * le col et la tête . Radiologie: fracture du massif trochantérien. IFSI . pour le sujet âgé: nécessité lever et appui complet prothèse.

Autre traitement possible des fractures du col chez les sujets âgés : les prothèses . Fracture sous trochantérienne sur une maladie de Paget : plaque de Judet.

DU SUJET AGE AUX URGENCES DU CHU DE NANTES. _____ . fractures cervicales vraies d'une part et les fractures trochantériennes d'autre part [1, 2, 3].

Le massif trochantérien comprend le grand trochanter, sur lequel s'insère le .. Nous prendrons comme description clinique la fracture du sujet âgé: il s'agit.

Les fractures trochantériennes sont trois fois plus fréquentes que les . Les fractures de l'ESF sont, de très loin, les premières fractures du sujet âgé et les.

Prothèses de hanche dans les fractures instables du massif trochantérien du sujet âgé. à propos . Faillite des ostéosynthèses dans certains types de fractures.

4 mai 2014 . Fractures traumatiques (90%) : sujet âgé avec chute de sa hauteur ou . Fractures trochantériennes = classification d'Ender selon la position.

La fracture de la hanche est plus fréquemment vue chez la personne âgée. . la localisation du trait de fracture (transcervicale, inter-trochantérienne et . Récupéré au <http://www.univadis.ca/merck-manual-pro/54/Sujets-speciaux/Reeducation>.

Chez le sujet âgé la gravité de ces fractures par leur morbidité et leur conséquence sociale et économique. Multiples méthodes de traitement ont été proposées.

Protecteurs de hanche pour la prévention des fractures de la hanche chez les . des fractures trochantériennes par plaque de compression percutanée (PC. . la prise en charge du sujet âgé avec fracture qui se distinguent essentiellement.

Mise en jeu du pronostic vital du sujet âgé fragile, et à tout âge le pronostic fonctionnel. .

Fracture du massif trochantérieur: trochantériennes, 2/3 des cas.

Depuis cette date il y a eu très peu de publications traitant de ce sujet . Classification selon Ender des fractures de la région trochantérienne (Extrait de EMC . des personnes âgées sont une indication pour ce type de traitement. L'âge.

Chapitre 6 - Fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Sections. Sous-sections . Il s'agit, le plus souvent, d'une personne âgée de sexe féminin. Douleur et . 6.3.5.2 Fracture trochantérienne . 6.4.2 Fracture chez le sujet jeune. A cet âge.

Les fractures trochantériennes du sujet âgé. Description matérielle : 288 p. Description : Note : Note bibliogr. Édition : Montpellier : Sauramps médical , 1996

-les fractures trochantériennes. . -TYPE ANATOMIQUE : 1/3 fc col du fémur, 2/3 fc trochantérienne. . vital chez le sujet âgé (complications du décubitus).

tures de la région trochantérienne traitée par clou. Gamma . Mots-clés : fractures trochantériennes ; ostéosyn- thèse ; clou .. Chez les sujets âgés, même.

12 nov. 2012 . III.5 Indications opératoires des fractures trochantériennes. . III.7 Intérêt de la chirurgie après FESF chez les sujets les plus âgés.

La fracture du col concerne essentiellement les sujets âgés (âge moyen = 74 ans) avec ... au niveau de la hanche, mesurée par la DMO inter trochantérienne.

Fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez le sujet âgé. Pr Emmanuel . 37 Traitement des fractures trochantériennes: conservateur. 38 Traitement des.

traduction "fracture sous-trochantérienne", Dictionnaire français-français en ligne . sous-trochantériennes par traumatisme à basse énergie chez le sujet âgé.

Chez une personne âgée, le but est de restaurer son autonomie le plus . Le traitement des fractures trochantériennes ou fractures du massif trochantérien.

28 oct. 2017 . Diagnostiquer une fracture de l'extrémité supérieure du fémur, en connaître les implications sur l'autonomie du patient. - Diagnostiquer une.

Nous traitons les fractures de la région trochantérienne par ostéosynthèse . Chez le sujet âgé les fractures non déplacées peuvent être ostéosynthésées.

On distingue ainsi les fractures du col du fémur au sens étroit du terme des . du fémur est une cause de mortalité dont la fréquence augmente avec l'âge. . de conserver la tête fémorale, ce qui est à rechercher, surtout chez les sujets jeunes.

Complications des ostéosynthèses des fractures trochantériennes. . de l'utilisation des cupules à double mobilité dans les fractures du col fémoral du sujet âgé.

21 oct. 2011 . Les fractures du col du fémur sont fréquentes chez les personnes âgées .. pour introduire le matériel d'ostéosynthèse du clou trochantérien.

8 déc. 2015 . Pronostic vital à court terme chez le sujet âgé. Pronostic fonctionnel à moyen terme à toute . 1 fracture col pour 2 fractures massif trochantérien.

Fracture du col du fémur : fracture fréquente de la personne âgée (50000/an en .. vis-plaque dynamique ou clou trochantérien, soit PTH chez le sujet plus âgé.

Fractures de la région trochantérienne instables. □. Trochantéro-diaphysaires. □. Per-trochantériennes comminutives. ⇨ VP DHS ou Clou Gamma Appui.

20 nov. 2014 . A l'extrémité supérieure du fémur, le massif trochantérien peut être fracturé . complications entraînent la mort des patients d'âge avancé dans 80 % des . Ainsi, ce massif osseux est souvent sujet à des fractures, surtout chez.

ITEM 359. FRACTURES FREQUENTES DE L'ADULTE ET DU SUJET AGE . Fractures trochantériennes : pseudarthrose aseptique. - Traitement chirurgical :

1- Âge : Le nombre de fractures de l'extrémité proximale du fémur augmente . En revanche, si l'impact se produit directement sur la région trochantérienne, le risque ... Chez le sujet âgé, ainsi que pour tous les autres types de fractures, une.

Chez le sujet âgé, la restitution de l'autonomie de la marche le plus . Traitement orthopédique pour certains chez le sujet jeune. . Fractures trochantériennes.

Les Fractures pertrochantériennes chez le sujet âgé . enfin les fractures inter-trochantériennes avec 10cas (6.84 %) La majorité de nos patients ont été traités.

Fracture plus fréquente chez la femme : chute de sa hauteur à domicile. • Particularité : pathologie . Les fractures trochantériennes du sujet âgé. 2e journée de.

Dans les fractures déplacées des sujets âgés, lorsque les conditions .. Dans les fractures sous-trochantériennes, la réduction peut être très difficile à foyer.

trochantériennes chez le sujet âgé. -. Montrer l'intérêt et l'importance du traitement chirurgical par la vis—plaque DHS de ce type de fracture. -. Evaluer et.

1 juil. 2001 . DU FEMUR CHEZ LE SUJET AGE (ETUDE PROSPECTIVE À PROPOS DE 88 CAS). . atteints de fractures du massif trochantérien, par le.

Les spécificités traumatologiques du sujet âgé . Primary total elbow replacement for fractures of the distal humerus », LP. . Fractures per-trochantériennes.

les fractures cervico-trochantériennes sont les plus fréquentes .. Fractures per, inter et cervico-trochantérienne chez le sujet âgé mise en charge précoce.

2 déc. 2014 . Sous le col du fémur se trouve le massif trochantérien. ... M Bruyère, Anesthésie

pour fracture du col fémoral chez le sujet âgé, Le Praticien en.

On Jan 1, 2003 P. Bonneville (and others) published: Les fractures du sujet âgé de . dans les fractures trochantériennes instables du sujet de plus de 75 ans.

prepECN prépare les étudiants aux ECN de médecine avec des supports pédagogiques multiples : fiches, référentiels, conférences, ECNi Blanches .

Les fractures du sujet âgé (basse énergie) déplacée . de l'impact sur la région trochantérienne.

La vitesse de la marche diminue avec l'âge. Une personne.

2 — Complications précoces : • générales (+ ++) (voir «Fractures cervicales vraies»); • locales . rotation externe, — souvent bien toléré chez le sujet âgé ; • pseudarthrose et nécrose sont exceptionnelles. . Fractures trochantériennes : traits.

On distingue 2 variétés de FESF: les fractures cervicales vraies et les fractures trochantériennes . Elles surviennent principalement chez le sujet âgé. • Elles se.

Cette procédure concerne les fractures du sujet âgé (>75ans). Elles interviennent . 6. fracture per-trochantérienne (idem inter-trochantérienne). 7. fracture sous-

Les fractures trochantériennes représentent par leur . moyenne d'âge des accidentés et par les répercus- .. jet normal) à 1 (sujet extrêmement porotique).

Béjui JB (1994) Ostéosynthèse des fractures trochantériennes. . Saillant G, Laude F et

Mabessone F (1 996) Les fractures trochantériennes du sujet âgé.

